

ЛЕКЦИЯ 13



ТЕМА: БОЛЕЗНИ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ И ЯГОДНИКОВ

- 1. Болезни винограда*
- 2. Меры борьбы с ними*
- 3. Болезни ягодников и меры борьбы с ними*

1. Болезни винограда

Вирозы и микоплазмозы

КОРОТКОУЗЛИЕ (ИНФЕКЦИОННОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ ВИНОГРАДА)



ИНФЕКЦИОННЫЙ ХЛОРОЗ



НЕИНФЕКЦИОННЫЙ ХЛОРОЗ





БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК



МИКОЗЫ

*МИЛДЬЮ
(ЛОЖНАЯ
МУЧНИСТАЯ
РОСА)*






*ОИДИУМ
(МУЧНИСТАЯ
РОСА)*




АНТРАКНОЗ





СЕРАЯ ГНИЛЬ



2. Меры борьбы с ними

Маточники подвойных лоз

1. Закладка черенков от здоровых растений
2. Уничтожение пораженных вирусными болезнями, бактериальным раком, антракнозом кустов
3. После листопада против накопления комплекса болезней или весной до распускания почек – 3% бордоской смесью.

Посадочный материал

1. Выбраковка саженцев
2. Строгая технология хранения, стратификации, закалки лозы.
3. При загнивании ростков обработка прививок ровралем 0,15% раствором.

Виноградная школка

1. Опрыскивание школки не менее одного раза в 10 дней с мая до августа против милдью, антракноза 1% бордоской смесью 6-8 кг/га по медному купоросу, топазом 0,15-0,25 кг/га против оидиума по мере появления болезни.
2. В конце августа выбраковка пораженных болезнями саженцев

Молодые и плодоносящие виноградники

1. В дождливую погоду со второй половины мая до середины июня через 10-12 дней опрыскивание против *милдью*: Микал 3 кг/га, Строби 0,15 кг/га, Бордоская смесь

против *оидиума*: вектра 0,3 кг/га, Байлетон 0,15-0,3 кг/га,

против *милдью* и *оидиума*: строби 0,15 кг/га.

против *милдью* и *антракноза* - оксихлорида меди 6 кг/га

против *серой гнили* – сумилекс 1 кг/га.

2. Против оидиума – 1 обработка – после цветения, следующие с интервалом 8-10 дней.

3. Против *серой гнили* – 1 обр. – при выпадении осадков в августе, 2 – за 30 дней до уборки.

3. БОЛЕЗНИ ЯГОДНИКОВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ



АМЕРИКАНСКАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА КРЫЖОВНИКА И СМОРОДИНЫ




АНТРАКНОЗ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА



СЕПТОРИОЗ СМОРОДИНЫ



*БЕЛАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ ЗЕМЛЯНИКИ
(РАМУЛЛЯРИОЗ)*



СЕРАЯ ГНИЛЬ ЯГОД ЗЕМЛЯНИКИ

Меры борьбы

1. Своевременная обрезка кустов, сжигание раст. остатков, сбор пораженных листьев, компостирование.
2. Прореживание кустов, перекопка междуурядий, хорошее проветривание посадок
3. Опрыскивание при появлении первых признаков болезней:
 - против мучнистой росы, серой гнили – байлетон – 0,4 кг/га, повтор через 8-10 дней.
 - антракноза, белой пятнистости, септориоза – оксихлорид меди – 6 кг/га, 1% борд. смесь – 6-8 кг/га. Расход раб. жидкости – 400-500 л/га.